

coupures, et la longueur de cette discussion n'aurait pas été justifiée par le nombre des espèces dont j'aurais eu à parler: il se borne à deux, pour lesquelles les anciennes divisions me semblent plus que suffisantes.

=Kafufo

24. EUCHARIS DICERODERA, m.

Euch. nigra, segmento post-scutellare transversim elevato et utrinque cornuto, cornubus longè retrorsum porrectis et anum superantibus.

Long. 3 et $\frac{1}{2}$ millim. — Lat. maxima, 1 et $\frac{1}{2}$ millim.

Animalulum singulare, exemplar mutilum, de affinitatibus nihilominus nil insciandum. Alae antennae partim pedesque toti desunt. Caput absque dubio huiusc generis, ut videtur, collatâ *Eucharide adscendente* LATR., vertice fronteque longitudinaliter sulcatis, facie laeviore subtilissimè punctulatâ. Prothoracis genuini dorsum sub mesothorace perfectè reconditum. Mesothorax anticè rectâ truncatus, segmento primo cum posteriore capitî paginâ in contactû immediato transversim rectangulo: secundo sive disco elevato-convexo, carinis duabus posticè convergentibus inaequaliter tripartito, sectione intermediâ latè reticulatâ antrorum sensim declive, posticè altius prominente rotundatâ gibbosâ, lateralibus discretim punctulatis, planis, extrorsum pronis, obliquè sub-ovatis, margine exteriore arcuato, angulo postero-interno acuto: segmentis scutellari et post-scutellari magnis, transversis, uniformiter convexis indivisis; scutello post-scutelloque propriè dictis haud distinctis, sulcis duobus transversalibus rectis parallelis inter se et a mesothoracis disco separatis, profundius longitorsum strigatis, coniunctim retrorsum declivibus, post-scutellare paulo maiore metathoracem partim obtegente utrinque cornuto, cornubus validis a posterioribus thoracis angulis ad abdominis extremitatem ultra horizontaliter prolongatis, intus arcuatim inflexis, apice paulò convergentibus obtusis, superficie striatâ. Metathorax planus, verticalis, segmento post-scutellare partim obtecto. Abdomen ut in *Euch. adscendente*.

Mâle unique, endommagé; femelle inconnue. Nous devons bien regretter de n'en savoir pas davantage. Les cornes post-scutellaires ne seraient-elles pas particulières aux mâles? Dans l'espèce européenne connue, les deux épines divergentes, qui partent, par parenthèse, du post-écusson et non de l'écusson, sont ordinairement plus développées dans les mâles (*Euch. cynipiformis* LATR.) que dans les femelles (*Euch. adscendens* id.).

SPINOLA
1853

Sixième sous-famille CYNIPSÈRES LATR. — *Diplolépaires*, m. ol. —***Ptéromalins*, N-AB-ES. — *Chalcidites* BRULL. etc.****25. LYCISCA RAPTORIA, m. *Mag. zool.***

La femelle unique, que M. GHILIANI nous a apportée du Para, est d'un tiers plus grande que celle qui avait servi de type à la figure et à la description publiées dans le *Magazin zoologique*. Elle remplace dignement, dans mon cabinet, celle que j'ai perdue. — Mâle, inconnu.

26. CHALCIS CONIGASTRA, PTY. *Del. anim. ins.*

Un bel exemplaire, femelle. Je n'ai à faire mention de cette espèce, assez connue d'ailleurs, que pour faire remarquer que son abdomen, qui semble si anormal au premier aspect, est cependant calqué sur le même moule que celui des *Ch. flavipes*, *minuta* etc. Les différences apparentes proviennent exclusivement de ce que la tarière et son appareil se prolongent notablement en arrière au-delà de l'anus et de ce que la sixième plaque dorsale destinée à les recouvrir est proportionnellement allongée en demi-cone droit et horizontal. Or ce caractère est purement sexuel. Il n'a pas lieu dans les mâles, il n'a donc pas la valeur d'un caractère générique. J'aurai à revenir sur cette observation au sujet de l'espèce suivante.

27. SMICRA ANNULIPES, m.

Smicr. flavo-testacea, thoracis maculis quinque dorsalibus tibiaruinque posteriorum annulitis duobus nigris. ♂

Long. totius corporis, 5 millim. — Ead. abdominis, 2 millim. — Ead. petioli, $\frac{3}{5}$ millim. — Lat. verticis exceptis oculis, 1 millim. — Ead. thoracis propè alarum originem, 2 millim. — Ead. maior abdominis, 1 millim. — Ead. petioli, $\frac{1}{2}$ millim.

Antennae approximatae in medio anterioris paginae capititis insertae, 12 articulatae ♂. Scapo crassiore vix summum verticem attingente, flagelli articulo primo parvo moniliforme nitido, reliquis subaequalibus cylindraceis parum distinctis, opacis, puberulis pube brevi stratâ, ultimo truncato. Caput transversum, vertice brevi convexiusculo vix dimidiatum capitatis latitudinem occupante; oculis magnis, lateralibus, oblongo-ovatis; ocellis tribus